

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Furasol 100/900 mg gargalas (milteliai tirpalui)

Furagino kalio druska / natrio chloridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Furasol galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 3 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Furasol ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Furasol
3. Kaip vartoti Furasol
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Furasol
6. Kita informacija

1. KAS YRA FURASOL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Furasol veikioji medžiaga tirpusis furaginas (furagino kalio druska) slopina mikroorganizmų ląstelių fermentų sistemų aktyvumą bei kai kurias kitokias biochemines reakcijas, todėl suyra bakterijos ląstelės citoplazmos membrana ir apvalkalėlis. Natrio chloridas reguliuoja tirpalo osmosinį slėgį, todėl stiprina tirpiojo furagino poveikį.

Furasol vartojamas infekcijos sukeltam burnos ir ryklės uždegimo lokaliai gydymui.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT FURASOL

Furasol vartoti draudžiama, jeigu:

- yra padidėjęs jautrumas (alergija) furaginui ar kitiems nitrofuranų grupės junginiams;
- pacientas jaunesnis negu 4 metų.

Specialios atsargumo priemonės

Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvartotus vaisto likučius reikia išpilti.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Jokios klinikai reikšmingos sąveikos nepastebėta.

Furasol vartojimas su maistu ir gėrimais

Tirpalu reikia skalauti burną ir ryklę tarp valgymų.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Nežinoma, ar saugu vartoti šį preparatą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, kadangi tokių tyrimų neatlikta. Nėščioms moterims ir žindyvėms vaisto vartoti nerekomenduojama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Furasol gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

3. KAIP VARTOTI FURASOL

Furasol visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 metų vaikams

Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Maišelyje esančius miltelius reikia ištirpinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šiltu tirpalu 2-3 kartus per dieną skalauti juo burną arba gargaliuoti. Paruoštas tirpalas yra skaidrus, geltonas. Tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima.

Jeigu manote, kad Furasol veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartojimo būdas

Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis – gargaliuoti apie 20-30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti.

Pavartojus per didelę Furasol dozę

Nitrofurano grupės dariniai yra mažai toksiški. Furasol, vartojamas pagal nurodymus, toksinio poveikio nesukelia. Apsinuodijimo šiuo preparatu atvejų nežinoma.

Pamiršus pavartoti Furasol

Jeigu praleista viena dozė, vaisto reikia vartoti toliau taip, kaip nurodyta. Gerti dvigubą dozę draudžiama. Jei būtina, reikia konsultuotis su gydytoju.

Nustojus vartoti Furasol

Po to, kai savijauta sunormalėja, vaisto reikia vartoti dar mažiausiai 2 paras. Per anksti nutraukus ar pertraukus preparato vartojimą, liga gali vėl paūmėti.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Furasol, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Paprastai Furasol yra gerai toleruojamas.

Labai retai (mažiau kaip 1 iš 10 000 vartojusiųjų) pasireiškė alerginė reakcija.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI FURASOL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

Paruoštą tirpalą suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima.

Ant paketėlio ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Furasol vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Furasol sudėtis

Veikliosios medžiagos yra furagino kalio druska ir natrio chloridas. Kiekviename paketėlyje yra 100 mg furagino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido.
Pagalbinių medžiagų nėra.

Furasol išvaizda ir kiekis pakuotėje

Oranžiniai rusvi, rupūs milteliai.

Kartono dėžutėje yra 5 arba 15 paketėlių, kurių kiekviename yra 1 g Furasol miltelių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

JSC „Olainfarm“

Rupnicu 5, LV-2114 Olaine

Latvija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB Corpus Medica

Sukilėlių pr. 61

LT-49333 Kaunas

Lietuva

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2013-09-30

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>

Prašome atidžiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.