

Листок-вкладыш - информация для потребителя

Фурасол® 100 мг порошок для приготовления раствора для наружного применения

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3-5 дня, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Фурасол и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Фурасол
3. Применение препарата Фурасол
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Фурасол
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Фурасол и для чего его применяют

Действующее вещество лекарственного препарата Фурасол – фуразидин калия является антибактериальным средством (производное нитрофурана). Порошок используют для приготовления раствора для наружного применения для лечения воспаления полости рта и горла, инфицированных ран, ожогов и гнойных воспалений.

2. О чем следует знать перед применением препарата Фурасол

Не применяйте Фурасол

- если у вас повышенная чувствительность к фуразидину калия или другим производным нитрофурана (также в анамнезе);
- если у вас аллергический дерматит.

Не применять для полоскания полости рта и горла детям младше 4-х лет (ребенок еще не умеет полоскать полость рта и горло).

Особые указания и меры предосторожности

Раствор лекарственного средства окрашивает кожу в желтый цвет.

Другие препараты и препарат Фурасол

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Лекарственное средство усиливает действие антибиотиков.

Препарат Фурасол с алкоголем

Вероятность развития кожных аллергических реакций во время лечения возрастает в случае употребления алкогольных напитков.

Беременность и грудное вскармливание

Не рекомендуется применять.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Фурасол не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы.

3. Применение препарата Фурасол

Раствор приготавливают непосредственно перед применением.

Приготовленный раствор нельзя хранить!

Содержимое пакетика растворяют в стакане (200 мл) горячей кипяченой воды.

Теплый раствор применяют для полоскания полости рта и горла 2-3 раза в день.

Раствор лекарственного средства также применяют для промывания ран и обработки ожогов и гнойных воспалений 1-2 раза в день.

В случае промывания ран раствор лекарственного средства:

- наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку

или

- наносят на перевязочный материал, а затем накладывают на рану.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Очень редко (проявляется меньше чем у 1 из 10 000 потребителей): аллергические реакции.

В этих случаях следует прекратить применение препарата и незамедлительно проконсультироваться с врачом.

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

5. Хранение препарата Фурасол

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в невидимом и недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию или с хозяйственными отходами. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Фурасол содержит

Действующее вещество: фуразидин калия.

Каждый пакетик порошка содержит 100,0 мг фуразидина калия, что соответствует 87,4 мг фуразидина.

Вспомогательные вещества: натрия хлорид.

Внешний вид препарата Фурасол и содержимое упаковки

Внешний вид

Крупный порошок оранжевато-коричневого цвета.

Упаковка

По 1 г препарата в пакетике из ламината.

По 5 или 15 пакетиков из ламината вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Олайнфарм»

Ул. Рупницу 5, Олайне, LV-2114, Латвия

Тел.: +371 67013705, факс: +371 67013777

Эл. почта: olainfarm@olainfarm.com

Листок-вкладыш пересмотрен: 02/2021